

**DISSERTATIO  
MEDICA,  
INAUGURALIS DE  
VACCINA. QUAM,  
ANNUENTE...**

---

---

DISSERTATIO MEDICA

INACUORALIS,

DE

VACCINA.





1

2

3

4

DISSERTATIO MEDICA,

IN AUSTRIALIBUS

DE

*F A C C I N A.*

SCRIPTA, &c.

ADVENTU SUO IN AUSTRIAM,

Et Assensu Academiae Medicarum Vindob.

D. GEORGH BAIRD, SS T.P.

ACADEMIAE MEDICORUM PRÆCEPTI,

PROPTER

AMPLIUM SERVIATUM ACADEMIAE Censuram

IN UNIVERSITATIS FACULTATIS MEDICAE Decretis,

*PRO GRADU DOCTORIS,*

HONORIS IN MEDICINA HONORIS AB UNIVERSITATE

DATE ET LECTORE. APPROBANTIBUS,

*Eruditionis carissimi subditi*

ARCHIBALDUS BRUCE A.B.

*Medici h. b. et p. AUSTRIÆ;*

PRÆST. REG. MAG. REG. SOC.

*Ad aet. 44. Junii, hactenus vixit.*

---

*Ex rebus medicis maxime cognitis.*

---

EDINBURGI,

ACADEMIAE C. STUART ET SOCI,

ACADEMIAE TYPOGRAPHI,

(LONDINENSIS.)

M DCCC L.



GEORGIO PEARSON M.D. F.R.S. Sec.

TAM MILTA TAMQUE TALA

REED HEMER PASHOTEN

MILINT,

REI

TAM ANCE TAMQUE BEMER

ARRENT,

HOI OPSCULON

DAT, DDAY, CONCORATON

A U C T O R



SAMUELI BARD, M. D.

RECENSIT

DAVIDI BOSACK, M. D.

COLLEGIUM COLUMBIÆ NYCV BROSACK

MEDICINÆ PROFESSORIBUS,

DE AMICITIAM SVIS CARISIMIS,

DE PRÆCEPTA DOCTA, SVIS TRACTATA,

SVISQVE SVIS TA BENEFICIA SVIS SV COLLECTA,

SVIS SVIS SVIS

SVIS, SVIS, SVIS SVIS SVIS

A U C T O R.



- Capriccio Pizzetti No 2

with fragments

from the author.

---

# DISSERTATIO MEDICA

## INAPOTENTIALIS,

DE

# VACCINÆ.

---

DOCTOR JOSEPH ALDO BAYON.

---

**S**ed, quæ hæmatum jam præci et præci abici  
morbi tam malis et tam veris, vel gravis levis-  
que saltem videtur, nisi in mentem venire, in-  
troductionem morbi novi præci momenti esse,  
vix possit. Nihilominus cum subvertatur,  
forte novo introductione, hæc inopi propo-  
situm amorem morbum, qui, est nuper magno-  
perè mitigatus fuit, tamen adhuc malis affert  
exitum, dissertationem de Vaccinæ hæc præfatus  
fuit Institutum, sperare licet.

Vaccinæ

Vaccina est morbus, et si nuper medicis, tamen  
 juredictum obstrictum fuit illis, quorum occupatio  
 cum vacis erat, a quibus hic morbus humanis  
 speciei communicatus est. Ab illis notatum est,  
 emulgentes vaccae, qui Vaccinae expoli sunt,  
 simul habentes hunc morbum, semper postea  
 Vaccina non occurrat obnoxiosum esse.

Hæc uti tara momentosa, cui tanti omnia veri-  
 ficata sunt, augere videtur generi humano com-  
 parando, primis animis Doctoris Jenner co-  
 munitis Gloucestensis, uti Vaccina præcipue  
 non erat, afflicta. Ex experimentis nonnullis  
 secunda, coram rationem publicam audire,  
 anno millesimo septingentesimo nonagesimo oct-  
 tavo, doctus est.

Magnitudo hujus investigationis nonnullis  
 medicis clavis, præcipue Doctores Poucha et  
 Woodville, dare operam, uti cum Doctore Jen-  
 ner investiganda verum naturam morbi et ejus  
 effectus in Vaccina infectione impedienda, fuit.  
 Experimentum ergo institutum erat, uti amplior,  
 quorum

quorum effectus sanasse ipsi congruunt, et  
historiæ separatis Dodsworth Parker et Wood-  
ville editæ sunt.

Ex illo tempore, curatio publica præcipit ad  
eam rem verâ esse, et commoda quæ inoculatio-  
nis ratio hodie magis ac magis evadunt manifesta  
ex multis experimentis et observationibus cunctis  
medicorum, quæ sapientiorum virorum ; quorum  
comitas in morbi natura intelligenda haud du-  
bitat esse quæ evadere sint solliciti, et quorum  
studia ad res humanas promovendas et adimendi-  
candum et gratitudinem huiusmodi generis possunt.

## HISTORIA.

## HISTORIA.

Principium delinquentis hucus morbum ut occurrat in specie humana, opus est reddere rationem quomodo se ostendat in vicia, unde Varias commemoravi est. In praefata tantum commemorabimus signa et in vicia occurrentia atque investiganda origines, unde morbus primus, hoc vel aliud dabo caput, ortus fuerit.

Vascula plerumque in, vixit tempore, postea in manus vel papilla uteri stromata, ostenda. Hae pustulae primas colore caeruleo, ut podis ludo, traxerit aqualem fluidum, partem circumdedit, tunc effusa, dedit, et infusum, continet. Hae pustulae, nisi compressi remedia adhibeantur, cito tendunt in ulcera phagedenica, quae constanter per, quod plerumque in crassa, morbo procedente, et denuo concitit in laborem, continet. Anomalia sunt angora, et ferrea hinc multum quomodo. Morbus

hic nunquam exhiberi vaccae effert, nec contagi-  
ofus pro more solito morborum contagiosorum  
est, sed communicari ipse contigit vaccae  
potest.

Hanc breviter appellationem Vaccinam, a vacca  
fortuito acceptam, narramus.

Hanc ulam pustulosa in ubi et papillae vac-  
cae Vaccinam formantia, ab experientia non  
dubia, rite inficiendus species humanae, cum  
ultra partem corporis, ubicunque cutis fredda sit,  
vires, quod mittunt, tangitur, habere invenien-  
tur. Inde fit, emulgentibus vaccae mamas fit  
partes, quae hoc morbo cula inficiuntur, et  
morbus signa jam exponenda ostendit.

Maculae inflammatae, vesiculae parvae ab in-  
fectione oris similes, in manus, et praecipue  
dexter artus et apices digitorum apparere in-  
cipiunt. Hac die ad suppurationem properant.  
Pustulae formam circulaem, cum marginibus  
plus centro elevatis, et colore subcaeruleo affe-

manu. Fluida materia pullulæ primis est re-  
nais et pellicula; sed, morbo procedente, fit  
substantia et parakeria. Absorptio, et eundem te-  
more in uilla, fit. Systema afficitur, pulsus  
acceleratur, et hæc horrores, scissas mollesces  
et dolores lomborum, ventris, et aliquando vel  
aliquid delirii, subsequuntur. Signa hæc febrili-  
ta, gradibus variis mollesces, sicut ab uno die  
ad tres vel quatuor, locis alternis in manus  
manubias, quæ sensibilitate partium promo-  
bilia sunt, et plurimæque uallè denantur, sicut  
phlogodentia scissila in unde orta exadentia,  
durant. Labia, nare, palpatæ et alias partes  
corpore aliquando affolia sunt; sed hæc affe-  
ctiones pland à partibus locant à dignis insi-  
dis agrotorum scissis, oriuntur.

Propter vim reddendæ aliæque nare ob-  
noxi Variolæ accipiendæ sibi propriæ, sed  
principat, propter imitationem et alia comarata  
sæpe uocatur, quæ Vaccina possidet, uallè  
introducendi eam in systema inoculatione eam  
capax est. Hæc nare comarata est non-  
nulla

nullo facilibus; nam ut malum accendens morbi in existensia topicæ ulcerationis pendet, observatum est, ut, in Vaccina inoculata, pustulae sicut non tam amplae nec profundae ut in morbo sicut accepto sint. Modo ille, pustula generalis loco uno contenta est; sed in hoc, ubiqueque virus partem laetentis cutis tetigit, pustula generatur ita ut haec rursus multa alia in manus et brachia emigrent, et ceteri qui fuerint ad contagionem expediti, videantur.

Morbus hic introduci in systema quocumque tempore vixit quoniam; sed, ut, durante derivatione, systema est maxime instabile, vitandus potius, si modo fieri possit. Sed si aeger illo tempore ad contagionem variolarem exponatur, non erit nocuisse inoculationem Vaccinae qualem subire particulam infectionis Variolae oportet.

De viis pro inoculatione diligendo observanda sunt sequentia.



ma, in viro à vaccina diligendo, non citil  
fides morbum, sub quo vaccina laborat, esse ve-  
ram Vaccinam oportet; ut haec morbi aliae res-  
ponsum postulatibus afficiant papillae, quae toto  
ciclo effectus in systema humanum ab his à vera  
Vaccina esse differunt. Quae res, juxta con-  
sideratione signis in vaccina occurrentibus pen-  
ditis adhibita, clare constabit.

ide, Pulchrum in virus degeneratum consistere  
virtutem morbi generandi, et virus vaccinam  
habere vim de morbo sepulcro, ostium, vel  
tombae, compertum est.

gto, Exempla haec debis inoculationem viro  
fluido à postula vaccinola suscepto, plerumque  
evadere secundum, docuerunt. Sed ut inocu-  
lante commoda haec omnia haec semper at-  
tingi possint, ratio aliqua conservandi virus sic  
necessaria; quod, virus in vitrum accepto, deinde  
sicco facti, transligens generose Arabice co-  
lisando, fieri potest. Doctus Jenner virus in  
calicem vel in vitrum collocatum, et deinde

in phiala parva conservatam, virescenti aëri (ubi propolis aliquæ ad finem usque ventum retinetur, pro conspecto habuit. \* Doctor Pearson, vires inculsam in phiala continens gas Hydrogenum vel Nitrogenum fixum tempus quidem longissimum conservari posse, invenit. † Ubi vires ita conservatas utendum est, exponenda ad vapores aque ebullientes, priusquam sit inoculatio, ad liquefactionem reddi necesse est. Sed viro nonnullis dies in tana humida servato, et corpori calido exposto, ad perfecti morbum excitandum non sufficere potest.

De modo communicande viro, via multæ opus est verbis, ut qui ei jam in usu Variolæ inoculatione facta bene convenit. Methodus hæc inoculandi, introducende filæ viro Vaccinæ impleto, ut magis facilior, et saepius secunda, jussu utenda est. Doctor Pearson hæcose ex platino factas usus, quippe quod oxydum sic non abstergeri, fadet. ‡

B

Nunc

\* Jones's Further Observations.

† Annals of Medicine for 1800.

‡ Idem.

Nunc ad phaenomena in Vaccinae inoculatione occurrentia narranda pergamus.

Circa tertium diem post introductam virus, parvamacula, inflammata circa locum ubi infectio facta fuit, apparet. Haec macula, magnitudinis crurum sit data, et parvus tumor aliquanto elevatus formatus est, tuncquam fluidae materiae in centro tumore clauditur diem sextum supervenit. Tumor hic crescit insens, et pustula magis repleta et dilata usque ad diem septimum vel octavum, ubi absorptio fit, sed continua serda praesens apud tumorem et dolores in velle, emittit. Haec signa septuaginta systematis generalis indicata copulataque, horribiles febres, anxietas, ardens dolores, sed magna, una cum acta celeritate pulsa subsequitur. Haec signa, plurimum valens, diem unum vel alterum, ubi sibi sponte decedunt, nulla celeritate infantis morandis, dantur. Affectio generalis systematis magis deservit pustula haec circulari inflammata margine circumdata, qui sibi apparet signa febribus durantibus, indicatur. Post hoc, melius

scris fluida pustulae gradatim efflorescunt; rubor circumdatus evadit pallidior, et in punctis distans evanescit, dum pustulae non amplius magnitudinem augentur; sed in superficie dura et crassa statim fusi coloris, quae sub sponte brevi tempore delabuntur, cute infra dura et alba, formantur.

Progressus Vaccinae inoculatae est fortis et facilis. Gradus affectionum localium et generalium sunt distincti; et variationes facientes, maxima ex parte, periodo pertransita occurrunt. Aberrationes observationum aliquando sunt, de quibus hic pauca dicenda.

Eruptio generalis pustulosa aliquando fit, non solum circa partem inoculatam, sed etiam extendit ad partes alias corporis. Hae pustulae illi variolae maxime valde similes, et ob multas causas inducuntur credens aliquando ejus morbi affinis; praesertim ut haec eruptio nulli forte in loco ad affectionem Variolae capotulae, oblectatur. Ob id Doctor Woodville hanc eruptionem effici cu-

in variolosa, cui modo aegri sub eam ejus characteri erant, progressione Variolae, perierit. Ut de hac re certior factus sit, nonnulla experimenta, ex quibus sequenda ejus resit magis firmata esse, iussit. †

Sunt exempla in quibus pustulae quidem earum cum ea ab inoculatione Variolae orti in nonnullis partibus lenchi apparuerunt. Eae pustulae ortae esse ab infectione facta rursus profunda, et ab infectione rursus infectae sunt membranam cellulosam eandem facta, exhibuerunt. In his exemplis, affectio partis inoculatione inflammantur violentius observari solet. \*

In nonnullis exemplis, irritatio localis aliquando producit eruptionem tamen circa partem inoculatam, quae vulgò dicitur *diam* tunc tamen modo apparet. Haec eruptio parva debet fieri illa proportionem fieri pustulosa crassitie.

*Aliquando*

† Weddell's Observations, 1800.

\* Grail's Lunar Medical Journal, No. XIV.

Aligando pustula vice propensionis sanandi habens, signis febribus celsioribus, manet valde inflammata; rubor augeatur, et pustula, nisi bene tractata, in ulcerulum degenerabit, quod plerumque longè diutè persistens et difficili sanatur.

Sequens ex Vaccina sequentibus Doctore Pearson observatum.

anæ, Eruptio Urticariae hinc inde diffusa.

casu, Eruptio, in infancibus solè, post Vaccinam mente serena vel tota curatur sine ulla, novissimas hebdomadas durans, sed pluri lincens, apparet.\*

#### DIAGNOSIS.

\* *Annals of Medicine*, 1806.

## DIAGNOSIS.

Trastandis signis diagnosticis, ut in Historia,  
morbi aspectus dignoscimus, ut in vacca et in  
specie humana occurrentes, consideramus.

Vaccas nomenclis morbis pustulosis, qui com-  
munitati humanae specialis systema contra infe-  
ctionem variolam defendere non possunt, ex-  
positas sunt. Ex hoc, virtus antivaricis Vac-  
cinæ hactenus dubiosa fuit, quod quidam, al-  
terum horum morborum hanc veram esse Vac-  
cinam putant, et ob id se esse viros inflectioni  
Variolæ obnoxios, postea Variolæ afflicti. Hinc  
est necessitas attendendi ad morbos hos,  
et amovendam omnes dubitationes de virtute  
verae Vaccinæ, et virtuti antivaricæ illarum  
aliorum morborum illi veræ Vaccinæ se con-  
sidat, hinc manifestat.

Ulcera pustulosa frequenter sui generis in po-  
pulis vaccinis apperunt; et exempla aliquando,

sed

sed minime saepe, maxime gemellorum, aliorumque eandem infectorum, et aliquod ab absorptione segrediente, occurrant. Hae pustulae multò leviores in à contagione Vaccinae verae oriuntur, et semper aliquo colore caeruleo aut livido tam manifesto in pustula vaccinali, sunt. Erysipelas talis constituit, procliviter talibus phagedenicum et in Vaccina moriuntur; sed citò in febrem, sine ulla aggraviatione vaccae, terminant. Hae pustulae variis temporibus ori, sed principaliter vasa, cute vaccae ab alimento libere abstrahantur et granula pascuntur, praeteritis lesantur pullos, apparet.\*

Vesiculae parvae albae in uber et papillas vaccae aliquâ levitatione, et aculeis infectis vel frictis inter emulgendum, saepe producuntur. Vesiculae haec leves quidem plerumque minime profundae, et facili terantur.

Vaccina vera, ab affectionibus jam dictis, à marginibus circa pustulam subcaerulea sibi propria

et

\* Jenner's Inquiry, 1794.



## 16      *DISSERTATIO MEDICA,*

*et à generali præceptione ultra profunda præ-  
decurri facili dignoscitur.*

Forma circuliata rubore maxime conspicua  
circumdata, marginis elevati, et contram pulsulas  
retinodas depressas tale cum à pulsula Varicel-  
lae, quae parte plena et angulata evadere in scis-  
sum tritus terminat; dum pulsula Vaccinae  
Scabiae Impidua, sed nunquam per condeat,  
gradatim induruit, marginis circuliato resistit,  
et demum fuscum crassum scabium formet,  
distinguit.

## PROGNOSIS.

Observatum est nos, quæ, Idiocyacra, vel  
ab illa causa illa incognita, veluti Varicel-  
lae sive modo naturali sive inoculatione obsecuti sunt,  
plerumque Indolenti Vaccinae resistere. Exem-  
pla talia occurrere videmus unde ad incognita  
sunt hominum observationes pro comperto habuit  
Doctor Woodville.\*

Si intra dies post viâ applicationem duas vel tres, tumor magnus et rubor circuli apud partem inoculatam evadant, deficiente inoculatione, nunquam tumor talis aut rubor adfuerint, pro vacillatio habetur.

Si die tertio vel quarto in partem inoculatam pustula magna centro elevato cum vesicula parva in apice et multa inflammatione circa basin appareat, absente viâ systematis Variolae obstantiae cura est.

Circulata pustula medio depressa hanc formam, signa febrilis aut cum rubore circumdata affectionis generalem ingentem evadente, inoculationem esse secundam, et non viâ systematis infectiois Variolae semper resistendi, ita indicant.

Morbus in infansibus semel tantum accidit esse. In illis nec ulla, sed in his, signa febrilis aliquando valde gravis sunt.

Ubi reber circa pustulam non praesquam  
 dies undecimam se, fuit semper plus septima-  
 diebus continuatur quia cum calore vel acie die  
 occurrat.

Eventus morbi huius, nullis adhuc ex vera  
 Variolae morbi exemplis occurrentibus, hacten-  
 que semper pro incerto habetur; nam exem-  
 pla verae Variolae attributa, alia morbi semper  
 certa esse pro certo asseperunt esse.

Si accurate ad sequenda aegri morbum, de  
 quo mentionem facit Doctor Woodville,\* con-  
 siderata attendamus, videlicet,

1<sup>ma</sup>. Virus quocumque infans inoculatus erat ab  
 exemplo pustulato desumptum esse,

2<sup>da</sup>. Aegrum certo variolae morbo esse  
 fuit Variola expertum esse,

3<sup>ya</sup>. Eruptiones pustulosas Variolae similes in  
 aegro

\* Woodville's Report.

segre apparere, necnon Variola non Vaccina  
certum esse sentiamus.

## METHODUS MEDENDI.

Hic morbus in infansibus ferè afficitur sine for-  
ma, tum leviore ut nihilò saepe opem medici-  
nam necessè erit.

In adultis, ubi signa febrilis aspera sunt, ad-  
ministratio aliquas levis refrigerantis cathartici,  
ut salis medii, ferè satis ad violentiam mitigandam  
est.

Ubi morbus modo regulari procedit, applica-  
tiones locales rariò opus est; sed ubi pulsa-  
ta, nec resiliè formandae subici, debet affic-  
tur, et partes circa valde inflammatae et bra-  
chium rigidum, tunc aliqua applicationi locali  
opus est.

Prospere ex Hydragyro, ut unguentum  
Hydragyri citrati parati dictos applicatum, et  
postea

posse caussam, et viam ipsa unguitum curae  
profunde conperta est.\* Plurimae tamen,  
refrigeranda externe applicata, ut Isolationem  
Canalis Acutae in aqua, aut sciti mentanum  
cum aqua, congruere satis bene discutienda in-  
flammatione iuventur est.

Ab ista post affectionem generalem systematis  
locali factum, et exinde ista systematis ad re-  
solvendum inflammationem Venulas perfectè confir-  
maturum esse, si inflammatio localis post deper-  
ditionem vel duodecimam maneat, applicanda  
gutta Aquae Lathyrigeni Acutae ad posticam,  
et cum struendo parte hora. trigesima curatur,  
et deinde particulae huiusmodi Aquae Lathyrigeni  
compulsa; partes inflammatae applicando, pro-  
gressus ipsi obviare sudebit.†

ORIGO.

\* Jones's Further Observations.

† Jones's Comments of Falls, &c.

## O R I G O.

Efficacia Vaccinae ubi propriè in systemate hæmato reddendo Variolæ minus obstat, prædictum in nonnullis partibus Angliæ, ubi hic morbus inter vaccas prævaleret, observati sunt. In Norfolkæ quædam nominatur Angliæ Poppe.\* In Hiberniâ nota fuit, et ibi virus quæ activitate observatur erant, et nominatur Slingh†

Periodus, cuius hic morbus primus liquor vaccae apparatus coarcti, parvi mortalitatis est; sed Vaccinæ non esse morbum præfatus novum, ut Doflor Jenner exempla quædam Vaccinae in humana specie supra ætate quinquaginta obliæ occurrence narravit, notatu dignum.‡

Quæsitio inter medicos, an Vaccina à vaccæ vel ab aliqua alia origine primus orta sit, agitur.

Secunda

\* Frazer's Inquiry.

† Esq's Letter Medical Journal, No. XVI.

‡ Jenner's Inquiry, 1798.

Sententia est Doctoris Jenner, Vaccinum dari vaccinæ à viro ulceram in callosis equorum morbo formantem, notam Variolaria et ab his vocantur Angliæ Cowpô, et hoc virus communicatum esse ab equo ad vaccinæ cruditatem qui ante curandis in callosis equorum ulceribus, quorum manus viro infectas, versati erant. Hanc sententiâ Doctoris Jenner à sequentibus formata est.

1<sup>mo</sup>. Vaccinum (nisi origo ejus indagari ad introductionem vaccinæ non fieri infelici possit) semper processum esse ab equo ulceribus in callosis liberatis, qui vaccinæ cruditatem fuerat infectus, et deinde hanc cruditatem ab illis ad vaccinam communicatam esse.

2<sup>da</sup>. Hanc esse sententiâ vaccinæ negotium curandis.

3<sup>to</sup>.

\* Jenner's Inquiry, 1792.

gus. Ex modo factis, et inoculando virus à calidius æquorum delinquo, monstrum produci-  
tum esse vidit Vaccinæ fœdus, et, ut in Vac-  
cina sit, hylæm humanam minus obnoxium  
Variolæ reddentem.\*

Nunc assuetus et alteram partem.

1m. A Doctore Pearson, Vaccinum multum  
in fœda, et si nulla vacca infecta in armeniam  
introdutta fuerit, et si unalgenice non tetigerint  
equos, et si equi nulli calidus alenatis, damant,  
et si in his fœda equi non admodum fuerint, et  
resque consuetam est.†

2m. Doctor Woodville facit ut vaccinæ virus  
ex æquorum calidibus alenatis utroqueque gradu  
morbis capto inocularetur; sed inde nulla se-  
quebatur Vaccina.

Virus

\* Jenner's Further Observations, 1799.

† Pearson's Inquiry.



Virus ex equorum calibus elonatum in speciem humanam introductum est; sed inde nulla sequitur Vaccina. †

Facta supra memorata, vix tam clare in lucem prodierunt, valde sunt discordantia, quippe ex quibus nulla certa conclusio eriri possit.

Hanc solutionem, nonnulla facta bene parum momenti nuper in lucem prodacta notando, ad lucem perducimus.

Exempla tria à Domina Lupton observata sunt.

In exemplo primo, mater valde Vaccinæ similis prodactus est in quodam homine cum adeo calum equorum morbo affectus, cui nomen est Angliæ Scratchy Rind, et qui, secundum mentem Domini Lupton, valde à morbo eo equi de quo fecit mentionem Doctor Jenner, differt.

In exemplo altero, morbus ex equo hoc modo sumptus vacca, in quâ vaccam produxit Vaccinam, imperitus est.

In exemplo tertio, Vaccina à vaccâ infectâ delumpta fuit.\*

Exempla jam recensita bene firmata, et valde ad firmandum Doctoris Jenner subdilectum Vaccinam esse morbum in vaccâ prius ab equo derivatum tendere, esse videntur.

## CONCLUSIO.

Ex jam dictis, Vaccinam, nonnullis in rebus Variolæ esse similem constat. Sed nonnulla circumstantiæ illi propriæ supra hanc esse, ut scilicet, passim videtur. Hi rasori conveniunt in eo, ut ambo sint pustulosi et quadam effluente, quæ legibus systemati propriis gubernatur ingente,

\* See G Paggi's Letter Med. Jour. XXI.

gesta, continet. Conveniunt utrum in quodam similitudine effectuum in Sylicem instaurum, in ut, qui hoc infectum fuerit, illi non abscedat sit.

Vaccina infectum Variolae non amplius obnoxium ex perquam multis, sine vel alia excep-tione, exemplis suis confirmatum est.

Variola infectum Vaccinae non amplius obnoxium ex experimentis Doctoris Pearson clari-oribus. \* Nam, si idem virus Vaccinae inocula-tur, infirmatio apud partem inoculatam circa decem unum vel quatuor, quae postea dicitur curatilis, levis solenniter sit. Haec infirmatio aliquando quidem regitur, et pustula parva, materia fluida limpida formatur; sed nunquam rubore circulari vel alio signis afflic-tionis generalem systematis indicandam conti-netur. Huiusmodi viri nonnulla exempla. In-terea: si idem pustulae ita formae viri produ-centes in his, quibus nunquam fuit Variola, reman-

\* Pearson's Letter. Lond. Med. Review and Misc. Aug. 1799.

verae Vaccinae, ni fallor, satis ex experimentis sequentibus habere constat.

*Experimentum unum.* Ego ipse, qui multum antea vari Vaccinam habueram, meipsum in manu vico Vaccinae, Calendæ Februarii, anno Domini millesimo octingentesimo primo, inoculaui. Die tertia inflammatio levis parte inoculata, quae ad diem sextum crescebat, ubi pustula parva, materiam solidam limpidam continens, apparuit; et die octavo scabies ipsa formata est, quae die decimo facto, depressione parvula cute nuda, deiecit. Totum per hoc experimentum satem nullum systematis affectionem generalem sed localem tantum experiri fuit.

*Experimentum alterum.* Die septima Idus Februarii, anno Domini millesimo octingentesimo primo, Annam Flöring, decem mensium natam, vico à pustula in manu mea delapso inoculaui. Die quarto pars inoculata inflammari coepit; et die decimo pustula circuli bene formata, rubore maxime conspicuo

dis-

In Vaccina inoculata, una sèpe sèmpet pullula sola exsistens, hac depositione curis tam infansculis, quae saepe Variolae succedunt; ita evanescit vitatur.

Vaccina, non effluvia per medium coeli, sed tantum contagia solo propagari potest. Nonnulla exempla Vaccinae infectorum cum illi integri valensque dominentium sine morbo impediendo à Doctore Jenner narrantur. Dominus H. Jenner faciliorem die septima ante partum viro Vaccinae inoculavit. Puercula, sed non festus laetitia, infecta sunt.\*

Indicium Vaccinae, et usus ejus et commodum exinde orta eventum felicissimum et maxime in Illustri Medicinae utilitas, et nobis spes jucundam cito videndi morbum hunc laetum et innocuum vice Variolae, maxime ex male genus humanum placentibus, sollicitum praebet.

Ex

\* Jenner's *Continuation of Essay*.

Ex jam dictis, Vaccinae effectus in taliu-  
riora et illustriora, et usum ipsa generalem eva-  
dere, non solum in his, sed etiam in morbis  
illis longe et late abhinc positis, curis hancu-  
rare et curis clavis, regionibus addere vim opus  
est.

FINIS.

IN TYPOGRAPHIA ACADEMICA



